



EARL RIBANJOU

Zone Horticole du Rocher

49125 TIERCE

Tel : 02.41.42.65.19

Fax : 02.41.42.66.45

@ ribanjou@wanadoo.fr

Site : www.ribanjou.com

L'AMELANCHIER

Famille des Rosacées

Depuis la surface aride des Causses Cévenols jusqu'aux reliefs Bourguignons, on trouve en France

L'AMÉLANCHIER OVALIS. Med.

Buisson grêle parmi les boqueteaux de Genévrier, remarquable au printemps par son **abondante floraison d'un blanc lumineux.**

Son feuillage est léger, duveteux. Les baies bleues noires renfermant de gros pépins allongés mûrissent à la fin de l'été en altitude moyenne. Leur **pulpe sucrée et agréablement parfumée donne une excellente confiture.**

Adultes, les plants atteignent **2 à 3 mètres**. Ils semblent inféodés aux terrains les plus pauvres et supportent relativement bien la sécheresse estivale grâce à un système racinaire très profond.

La plupart des AMELANCHIERS commercialisés aujourd'hui sont originaires d'Amérique du Nord où on les rencontre du Québec à la Louisiane.

L'AMÉLANCHIER LAEVIS

C'est le plus vigoureux en arbre isolé.

Les jeunes feuilles sont glabres et pourprées. Les feuilles adultes sont assez grandes, ovales allongées, très finement dentées sur les 2/3 du limbe.

Il porte de larges grappes de grandes fleurs.

Les fruits précoces mûrissent en juin à Angers.

L'AMÉLANCHIER DU CANADA (Amélanchier canadensis L. Medic)

Malgré une **croissance lente**, l'arbre peut mesurer in fine **10 à 15 mètres** selon son habitat. Le bois fin à écorce lisse porte de longs bourgeons pointus.

En avril ou au début mai, les fleurs apparaissent en premier à l'extrémité des rameaux, regroupées en grappes lâches dressées ou semi retombantes.

Les feuilles caduques, entières, sont alternes, de forme ovoïde, finement denticulées et vert glabre.

Les **fruits**, délicatement parfumés à maturité, prennent une couleur rouge vif puis brun violacé. Ils mûrissent **sur une période de 15 à 20 jours à partir de la mi-juin** dans les conditions angevines. Sans protection, ils font le délice des oiseaux. A l'automne, le feuillage se teinte de jaune vif et de rouge avant de chuter.

Pour une production fruitière, il faut éviter de placer l'arbuste dans des conditions de sol trop fertile. Il peut être utile de palisser les rameaux sous forme d'une palmette à la diable pour limiter la hauteur à 2 mètres. Aucune taille systématique n'est pratiquée mais un élagage périodique est souhaitable tous les 3 ou 4 ans.

L'Amélanchier du Canada est un **arbre très rustique**, s'adaptant à tous les types de sol et **supportant bien le soleil et la sécheresse**. En dehors d'une sensibilité possible au "feu bactérien", comme beaucoup de rosacées actuellement, la plante n'héberge **pas de parasites spécifiques**. Toutefois, dans nos pépinières, elle se révèle **sensible à l'oïdium** en période estivale. Quelques **traitements au soufre** viennent à bout facilement du parasite.

L'AMELANCHIER VIRIDIFOLIA

Cette nouveauté sélectionnée aux pépinières RIBANJOU est **apparentée à l'Amélanchier Alnifolia** par son port érigé, sa vigueur moyenne, sa floraison abondante, en grappes allongées, compactes et dressées.

Elle en diffère par la couleur vert tendre de son feuillage au printemps, la précocité de ses fruits (fin juin) et l'amertume caractéristique de ces mêmes fruits qui rappelle davantage la saveur de l'aronia que celle douceâtre de l'Amélanchier traditionnel.

A noter que cette espèce présente aussi un drageonnement important au niveau de la souche

L'AMÉLANCHIER À FEUILLE D'AULNE (Amélanchier alnifolia, Nutt.)

Originaire du Canada et du Nord des USA, **l'arbre plus compact ne dépasse pas 2 à 3 mètres**. Il couvre de très grandes surfaces d'Est en Ouest du continent américain et présente aujourd'hui de nombreuses variétés

La floraison en grappes terminales dressées assez dense est plus tardive d'une quinzaine de jours.

Les feuilles duveteuses sur la face inférieure sont plus arrondies, plus épaisses et d'un vert plus soutenu. La denticulation est grossière et irrégulière.

**Le fruit est plus gros, sa maturité plus homogène et plus tardive (mi-juillet).
C'est un fruit sans acidité, riche en pectines, en arôme et en vitamines qui se consomme frais ou en confiture.**

Petit arbuste très rustique doté d'un système racinaire pivotant et très développé, il croît lentement mais **produit très rapidement de grandes quantités de fruits**. Il apprécie les sols argileux ou argilo calcaire riches en humus et les expositions sud sud-ouest bien ensoleillées.

D'autres espèces proches de l'Amélanquier *Alnifolia* diffèrent par leur vigueur et leur période de maturité.

L'AMÉLANQUIER AMABILIS

Est un arbuste érigé, vigoureux, aux larges feuilles arrondies, grossièrement dentées.

La fleur tardive en grappes lâches est de grande taille

Le fruit mûrit fin juillet

L'AMÉLANQUIER SANGUINEA

Est intermédiaire. Proche en vigueur d'A. *Alnifolia*.

Les feuilles sont rondes ou subovales, grossièrement dentées.

Les fleurs sont également moyennes, portées sur des grappes assez lâches.

L'AMÉLANQUIER HUMILIS

Est le plus petit, il dépasse rarement 1 mètre.

Les fleurs sont petites sur des grappes denses et dressées.

Ces espèces sont essentiellement à vocation ornementale bien que leurs fruits soient aussi comestibles.

A noter que tous les Amélanquiers sont d'excellentes plantes mellifères.

Toutes ces espèces sont disponibles ou peuvent l'être dans un délai raisonnable, sous forme de jeunes plants, issus de semis.